Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de Tortosa

Avís del dia: 4 de setembre de 2026
Avís 13/2026

Cultius:
Arròs, cítrics, olivera, horta, fruiters i parcs i jardins

Actuacions en parcel·les abandonades

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc per les plantacions veïnes.

El Decret 137/2014, de 7 d'octubre, en el seu article 6.1 indica que *"Les plantacions de conreus llenyosos tenen consideració de conreu abandonat si en els darrers dos anys no s'hi ha practicat operacions de conreu"*. L'article 6.2 estableix que *"és obligatòria l'arrencada i destrucció dels conreus, plantacions, collites i material vegetal que constitueixi un risc fitosanitari greu"*.

Demanem la col·laboració per a la identificació de les parcel·les que es puguin considerar abandonades i que contacteu amb els Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l'Ebre.

Arròs:

Caragol poma (*Pomacea* sp.)

El DARPA ha publicat la nova Resolució ARP/1506/2026 de 13 de maig, per la qual es fixen mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (*Pomacea* sp.) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià que modifica l'anterior RESOLUCIÓ ARP/996/2017, degut a la nova situació del cargol poma provocada pels aiguats de la tardor del 2025.

S'ha publicat la Resolució ARP/2671/2026, de 22 de juliol, per la qual s'amplia el crèdit pressupostari dels ajuts destinats a subvencionar els costos per a la compra de productes a base de saponines en la lluita contra el cargol poma al delta de l'Ebre convocats mitjançant la Resolució ARP/4613/2025, de 2 de desembre (ref. BDNS 874073): https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1051258

Males herbes

Es recomana evitar al màxim la disseminació a altres camps de llavors o plantes, especialment d'*Echinochloa spp.*, i de les espècies invasores *Leptochloa spp*. i *Leersia oryzoides*. Si en detecteu als camps, elimineu-les i aviseu a Sanitat Vegetal.

Cítrics:

Mosca blanca (*Dialeurodes citri*)

Dialeurodes citri presenta un cicle biològic amb tres generacions molt marcades. Per cada generació existeixen dos moments adequats per fer el tractament:

- Màxim d'ous

- Màxim de larves de primers estadis (L1+L2).

En aquests moments el percentatge de larves de primers estadis (L1 i L2) està augmentant en les finques de seguiment. S'espera que el nivell de larves sensibles es mantingui elevat aproximadament durant els propers 10 dies, per tant, aquest període serà el moment de fer el tractament de màxim de larves.
Cal tenir en compte que existeix variabilitat entre les finques depenent del moment en què es van produint les noves brotades.

En aquesta tercera generació, més propera al moment de la collita, cal anar en compte amb el producte fitosanitari escollit i respectar el seu termini de seguretat. S'ha de tenir en compte que les larves estan al revers de les fulles, per tant, cal mullar bé aquesta zona utilitzant la pressió i volum de caldo adequats.
Cal evitar els productes fitosanitaris que tinguin efecte negatiu sobre *Cales noacki* que exerceix un bon control sobre *Aleurothrixus floccosus.*

Aranya roja (*Tetranychus urticae***) Àcar roig (***Panonychus citri***)**

Amb les condicions climàtiques d'aquest estiu cal vigilar els atacs per aranya.
Per a aranya roja es recomana el tractament quan hi hagi més d'un 7% de fulles amb colònies amb formes mòbils o presència de dany en fruit. El àcar roig es tractarà quan s'observin més d'un 20% de fulles ocupades o 2% de fruits amb formes mòbils. No s'ha de tractar si hi ha més d'un 30 % de fulles amb presència de fitoseids.
En els dos casos es recomana tractar solament els focus, mullar correctament les parts més elevades dels arbres i alternar les matèries actives emprades.

Mosca de la fruita *(Ceratitis capitata)*

En el marc de l'ajut per Sistemes alternatius a la lluita química per la mosca de la fruita en cítrics s'ha d'instal·lar en camp la captura massiva o l'atracció i mort abans que apareguin les primeres poblacions de la plaga. L'objectiu d'aquestes tècniques es rebaixar el nivell de les poblacions d'adults. Un dels requisits per tal d'acollir-se aquest ajut és ser soci d'una ADV.

En aquests moments les captures no són elevades i estan per sota de la mitjana dels darrers anys. Tot i això existeix molta variabilitat entre les poblacions de les diferents finques. Caldrà estar atent al moment de maduració de les varietats primerenques i protegir la fruita a mesura que vagi iniciant el canvi de color. Si es realitzen tractaments químics s'han d'alternar les matèries actives i tenir en compte el termini de seguretat de les mateixes.

Scirtothrips aurantii

El Laboratori Nacional de Referència ha confirmat la detecció en trampa groga d'individus d'*Scirtothrips aurantii* a Catalunya en tres municipis de les Terres de l'Ebre: Alcanar, Santa Bàrbara i Tortosa. Aquesta plaga està considerada plaga de quarantena per la Unió Europea.

Des de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre s'estan realitzant mostrejos al voltant de les finques detectades mitjançant trampes grogues per capturar adults, colpeig i també amb observació visual de símptomes en fulla.

L'adult és de color groc i és més petit (0,6-0,9 mm) que altres trips freqüents en cítrics com són *Pezothrips kellyanus* (Pezothrips) i *Chaetanaphothrips orchidii* (Thrips de la orquídea). És una espècie molt polífaga, entre els principals hostes estan els cítrics, mango, alvocat, vinya, magraner i cotó. A Andalusia també s'ha trobat en caqui, fresa, gerd, mora i nabius.
S'alimenten dels teixits en creixement com brots, fulles i fruits en formació. Els símptomes i danys són cicatrius allargades paral·leles al nervi central de la fulla, fulles en forma de punta de fletxa, atacs severs en noves brotades i cicatrius en fruit.

Caldrà estar atents, observar amb deteniment possibles símptomes en brots, fulles o fruits i, en cas de sospita, avisar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre.

Trips de la orquídia *(Chaetanaphothrips orchidii)*

Es desenvolupen sobre els fruits en les zones de contacte entre fruits i fruits amb fulles. Els danys consisteixen en taques fosques de forma circular en la zona de contacte entre fruits o també taques irregulars en altres parts que van enfosquint-se. S'aconsella observar 100 fruits en contacte de la part inferior de l'arbre des del mes de juliol i fer tractament si hi ha més d'un 5-10% de fruits amb presència de trips o si s'observa algun fruit amb danys i hi ha trips.

Àcar roig de Texas, Àcar roig oriental *(Eutetranychus sp)*

Durant els darrers anys a finals d'estiu en algunes finques es detecta un increment de la incidència d'aquests àcars majoritàriament en tarongers. Cal estar atents per a detectar la seva presència. Colonitzen principalment l'anvers de les fulles al voltant del nervi central on s'observen restes de mudes de color blanquinós. Prefereixen les superfícies exposades al sol i, per tant, aquestes zones de l'arbre són les més afectades. Els danys, platejat i punts cloròtics en fulles i fruits, són semblants als produïts per *Panonychus citri.*



Mascle



Femella

Olivera:

Mosca de l'oliva *(Bactrocera oleae)*

Ja s'ha iniciat la instal·lació de la captura massiva contra la mosca de l'oliva en les parcel·les que ho han sol·licitat mitjançant la DUN (trampes grogues en forma cònica). L'objectiu d'aquesta tècnica de lluita es rebaixar les poblacions d'adults de forma continua durant tot el període de vol de la plaga. Si observeu alguna irregularitat en la vostra finca poden demanar informació a l'ADV per al control de la mosca de l'oliva al Baix Ebre i Montsià: 639 300 061 o advmoscaolivera@gmail.com.

En els punts de seguiment de la plaga les captures son baixes. En general no s'observa oliva picada que justifiqui fer un tractament. És previsible que tant la població d'adults com l'oliva picada augmenti si arriben les pluges. Així, cal vigilar l'evolució de la picada en cada finca i si es necessari realitzar un tractament larvicida per evitar que aquestes evolucionin.

Cal vigilar especialment l'evolució de la picada en varietats primerenques (Farga, Arracada, Empeltre...) i en aquelles finques on l'oliva es susceptible a ser picada (que es reguen o que tenen poca collita).

Si les olives es mantenen arrugades durant uns dies les larves de la mosca moren de forma natural i per tant, si hi ha olives arrugades no cal tractar.

Repilo, sabonosa i pedregades

Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es continuen veien símptomes.

Per repilo, cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es continuen veien símptomes. En cas de plogudes o humitats altes que afavoreixen les infeccions cal que realitzeu un tractament preventiu. Si plou mes de 15-20 litres/m2 s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Les pluges i humitats altes acompanyades de temperatures suaus poden provocar infeccions de repilo a les fulles i sabonosa a les olives. Si hi ha repilo i sabonosa, és important fer un tractament abans o durant el canvi de color, es recomanable repetir el tractament passats 15 dies.

En cas de pedregada es aconsellable fer un tractament el més ràpid possible amb fungicides a base de coure.

Horta

Tomàquet

Tuta absoluta

Seguint les corbes de vol registrades durant les campanyes passades, Tuta podria assolir els màxims poblacionals a partir d'aquest mes de setembre. Per tant, caldrà vigilar sovint les plantacions i aplicar les mesures de control de manera constant allà on les poblacions hagin estat elevades durant l'estiu. Acabada la plantació, és molt important realitzar un treball del sòl per tal d'eliminar les pupes enterrades. Dins els hivernacles, el treball del sòl i el buit biològic durant el màxim temps possible són les mesures més eficaces.

Erugues de lepidòpters (*Helicoverpa armigera, Spodoptera sp, Autographa gamma*)

En el mes de setembre les poblacions pugen substancialment i afecten diversos cultius. Els tractaments aplicats per al control de Tuta absoluta també les poden controlar. L'eliminació dels tomàquets afectats és important per reduir les poblacions dins la parcel·la.

Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum* i *Bemisia tabaci*)

Les poblacions de mosca blanca poden incrementar-se, sobretot *Bemisia tabaci*. Els enemics naturals poden controlar aquesta plaga, per tant, els tractaments fitosanitaris es realitzaran amb els productes que tinguin menor impacte sobre aquests organismes i alternar el grup químic o mode d'acció per evitar resistències.

Col i Coliflor

Erugues

És convenient la utilització de planter sa i el manteniment d'un cultiu lliure de males herbes. És important detectar la plaga el més aviat possible ja que s'ha d'actuar en els primers estadis larvaris. Si s'observa la seva presència en un 10% de plantes es recomana realitzar algun tractament. Si les cols estan molt tancades els productes fitosanitaris no arriben a l'ull de la planta.

Fruiters

Presseguer i Nectarina

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Estan augmentant les captures i danys en algunes finques. Es recomana protegir les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.
És molt important la recollida dels fruits abandonats a l'arbre i la retirada o la destrucció de la fruita que hi hagi al terra.

Pugó verd

En cas d'observar reinfeccions de pugó en alguna plantació, es recomana renovar la protecció. Cal aplicar matèries actives de famílies diferents a les utilitzades en anterioritat per minimitzar els problemes de resistències.

Anarsia

Ens trobem en el moment d'eclosió de la tercera generació, la qual es preveu que sigui molt ràpida. En finques on hi hagi incidència, es recomana tractament ovolarvicida.

Grafolita

Ens trobem en el moment final d'eclosió de la quarta generació, la qual es preveu que sigui molt ràpida. En finques on hi hagi incidència, es recomana tractament ovolarvicida.

Cendrosa - Monilia

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de la caiguda del collarí fins l'enduriment de pinyol.

Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina.

Mosquit verd

En algunes zones es poden observar puntes de fulles seques. En aquests casos es recomana realitzar algun tractament per reduir la població i mantenir els brots.

Ametller

Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

Aranya

S'estan detectant símptomes a la majoria de plantacions, vigileu-les.

Tigre

Les altes temperatures i la sequera afavoreixen aquesta plaga, vigileu les vostres plantacions.

Parcs, jardins i espais verds:

Palmeres

Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Fins al mes de novembre hi haurà activitat de la plaga. Durant aquest període, no convé fer treballs de poda ja que les ferides poden ser un atraient de la plaga. Cal continuar observant si hi ha símptomes sospitosos. Les palmeres afectades per la plaga que han mort, les que es consideri que no es poden salvar, i les restes afectades procedents de sanejaments, es recomana destruir-les i dur-les als punts establerts per gestionar-les adequadament. En zones afectades, es recomana aplicar tractaments preventius amb productes fitosanitaris.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

facebook.com/agriculturacat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tortosa (977 58 11 81)
Crta. València, 108. 43520 Roquetes. Telèfon 977 500174 terresebre.agricultura@gencat.cat http://www.gencat.cat/daam